



Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Нафазолин-DF

Торговое название

Нафазолин-DF

Международное непатентованное название

Нафазолин

Лекарственная форма

0,05% спрей назальный по 10 мл

Состав

10 мл препарата содержит

активное вещество – нафазолина нитрата 5,0 мг

вспомогательные вещества - борная кислота, вода очищенная

Описание

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы. Назальные препараты. Антикongестанты и другие назальные препараты для местного применения. Симпатомиметики. Нафазолин.

Код АТХ R01AA08

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Терапевтический эффект нафазолина развивается через 5 минут после впрыскивания препарата и продолжается до 8 часов. При местном применении нафазолин может всасываться в системный кровоток и оказывать системное действие.

Фармакодинамика

Альфа-адреномиметик. Нафазолин является симпатомиметиком с прямым стимулирующим действием на альфа₂-адренорецепторы. Вследствие сосудосуживающего действия уменьшается отечность, гиперемия, экссудация. При интраназальном применении нафазолин способствует облегчению носового дыхания при ринитах. Способствует открытию и расширению входных протоков придаточных пазух носа и освобождению евстахиевых труб. Это способствует оттоку секрета и предотвращает осаждение бактерий на слизистой носа.

Показания к применению

- острый ринит
- сенной насморк
- гиперемия и отечность слизистых оболочек верхних дыхательных путей после операций
- риноскопия

Способ применения и дозы

Интраназально.

Нафазолин – DF, 0,05% спрей назальный применяют у детей:

- от 2 до 6 лет – по 1-му впрыскиванию спрея в каждый носовой ход 1-2 раза в день;

- от 6 до 15 лет – по 1-му впрыскиванию спрея в каждый носовой ход 3 раза в день.

Курс лечения 5-7 дней. Повторный курс лечения назначает врач.

Побочные действия

- раздражение слизистой оболочки
- повышенное артериальное давление, тахикардия
- тошнота, головная боль
- реактивная гиперемия слизистой оболочки
- при применении более 1 недели – отек слизистой оболочки, атрофический ринит

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз
- тяжелые заболевания глаз
- гипертиреозидизм
- сахарный диабет
- хронический ринит
- одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы и период до 14 дней после окончания их применения
- детский возраст до 2 лет

Лекарственные взаимодействия

Препарат замедляет всасывание местноанестезирующих средств (удлиняет их действие при проведении поверхностной анестезии).

Несовместим с ингибиторами моноаминоксидазы.

Особые указания

Нафазолин-DF с осторожностью применяется у лиц с лабильным артериальным давлением.

Применение в педиатрии

При строгом соблюдении рекомендованного режима дозирования, способов применения (интраназальное введение) и продолжительности использования (не более 5-7 дней) побочные и нежелательные явления встречаются редко.

Передозировка

Симптомы - снижение температуры тела, брадикардия, артериальная гипертензия.

Лечение - симптоматическое.

Форма выпуска

По 10 мл в полипропиленовые флаконы с крышкой-распылителем и защитным колпачком. На каждый флакон наклеивают этикетку. По одному флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку картонную.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре от 18°C до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

3 года

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель/Упаковщик: TOO "DOSFARM", Казахстан, 050034, г.Алматы, ул.Чаплыгина, 3,

тел.: (727) 253-03-88

Владелец регистрационного удостоверения

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции

ТОО «DOSFARM», Казахстан, 050034, г. Алматы, ул. Чаплыгина, 3,

тел./факс: (727) 253-07-07, 253-03-88, эл. адрес: dosfarm@dosfarm.kz